

신종인플루엔자 예방접종 후 안내문

1 예방접종 후 일반적인 주의사항

- ◆ 접종당일과 다음날은 과격한 운동을 삼갑니다.
- ◆ 접종 당일은 목욕을 하지 않는 것이 좋습니다.
- ◆ 접종 부위는 청결히 유지합니다.

2 예방접종 후 이상반응 발생시 대처방법

- ◆ 예방접종을 받고 난 후 정상적인 면역형성 과정에서 몇 가지 가벼운 증상이 나타날 수도 있습니다.
- ◆ 드물게 나타나는 예방접종 후 이상반응은 다음과 같습니다.

<1> 경미한 증상

- ▶ 예방접종 부위에 통증, 발적, 압통, 부종 등이 나타날 수 있으나 대부분 2일 이내 사라집니다.
- ▶ 두통, 발열, 메스꺼움, 근육통 등이 드물게 나타날 수 있으며, 대개 접종 후 6~12시간 이내 발생하여 1~2일간 지속되다가 사라집니다.

☞ 위와 같은 증상들은 대부분 일시적으로 나타나는 증상입니다. 하지만 **경미한 이상반응이라도 3일 이상 증상이 지속되면 의사의 진료를** 받아야 합니다.

<2> 심한 증상

- ▶ 예방접종 후 중증 이상반응인 '아나필락시스(알레르기성 쇼크)' 증상이 매우 드물게 나타날 수도 있습니다. 이러한 알레르기 반응은 호흡곤란, 쉼 목소리, 두드러기 등의 증상이 특징이며 대체로 예방접종 직후 또는 수 시간 이내에 발생합니다.
- ▶ 예방접종 후 매우 드물게 근력약화 및 손·발가락 감각 이상증상(길랑-바레 증후군)이 나타날 수 있다는 보고가 있습니다. 길랑-바레 증후군과 백신접종과의 관련성은 아직 명확하지 않으며, 대부분 이 증상은 2개월 이내 완전히 회복됩니다.

☞ 위와 같은 증상들은 매우 드물게 발생하며, 만일 **유사 증상이 나타나면 즉시 의사의 진료를** 받아야 합니다.

- 예방접종 후 이상반응이 발생하면 관할지역 보건소 또는 예방접종도우미사이트(<http://nip.cdc.go.kr>)를 통해 신고하실 수 있습니다(학생, 학부모, 교사 등 누구나 신고 가능).
- 예방접종 후 이상반응이 신고되면 보건소 및 질병관리본부의 역학조사가 즉시 진행되며, 동일 제조번호 백신에 대한 식품의약품안전청의 정밀검정이 실시됩니다.

※ 예방접종으로 인한 중증 이상반응이 발생할 경우는 「예방접종피해 국가보상제도」 및 「예방접종피해보상심의회」결정에 의거 진료비, 장애 등에 대한 보상금이 지급됩니다.

